

experimento, usando apenas o genótipo suscetível BR 601, efetuou-se a infestação com uma densidade de pulgões de 0, 5, 10, 15, 20 e 25 indivíduos de sete dias de idade por planta, quando esta estava com 11 dias após o plantio. Num segundo experimento, incluindo também o genótipo resistente TX 2567, utilizaram-se densidades de 0, 10, 20 e 30 pulgões por planta, com as infestações realizadas quando as plantas estavam com 16, 26 e 36 dias após o plantio. As avaliações basearam-se em uma escala de notas de 0 (nenhum dano) e 9 (acima de 81% de necrose da planta) e na diferença do crescimento entre plantas infestadas e não infestadas. Concluiu-se que, quando sujeitas à infestação inicial a partir de 10 pulgões por planta, as plantas da cultivar suscetível morrem em 21 dias, independente da época de infestação, enquanto que as plantas da cultivar resistente, mesmo com infestação inicial de 20 pulgões por planta, continuam vivas por um período mínimo de 28 dias e com incrementos médios no tamanho de 68,6% em relação a plantas sem infestação. Também concluiu-se que tanto as plantas resistentes quanto as suscetíveis suportam uma mesma infestação inicial por um período mais longo, quando a infestação ocorre em plantas mais desenvolvidas. - *Ivan Cruz, José D. Vendramim.*

NÃO-PREFERÊNCIA COMO MECANISMO DE RESISTÊNCIA DE SORGO AO PULGÃO-VERDE, *Schizaphis graminum*

O pulgão-verde é uma das mais importantes pragas do sorgo, sendo que só nos E.U.A. já se chegou a gastar mais de dez milhões de dólares anualmente com medidas de controle baseadas em inseticidas. Dentre os métodos alternativos para o controle dessa praga, o uso de variedades resistentes tem sido um dos mais promissores. Do ponto de vista de melhoramento visando a resistência à praga, a determinação dos mecanismos que regulam a resistência é fundamental. O objetivo do trabalho foi estudar o mecanismo de resistência por não-preferência de diferentes genótipos considerados resistentes ao inseto. Foram avaliadas, em teste de livre escolha, 28 fontes de resistência. Essas fontes foram aleatoriamente divididas em quatro grupos de sete genótipos, sendo cada grupo estudado em ocasiões diferentes, tendo, porém, em comum duas testemunhas suscetíveis. Os genótipos foram semeados em vasos, de maneira circular, fazendo a casualização dos tratamentos dentro de cada vaso. O espaçamento entre plantas foi de 5 cm. Após a emergência, as plantas foram cobertas com gaiolas de forma cilíndrica, com armação de arame grosso e cobertas por um tecido fino. Onze dias após o plantio, foram liberados sobre o solo, no centro de cada vaso, 45 pulgões adultos (ápteros), numa densidade média de cinco pulgões por planta. Após 24, 48, 72 e 96 horas contou-se o número de pulgões adultos por planta (genótipo). O delineamento foi em blocos ao acaso

com 18 repetições (16 em alguns casos). Concluiu-se que não-preferência é um dos mecanismos de resistência ao pulgão-verde, encontrada principalmente nos genótipos TX x 430 x GR, GSBT x 399, GR, Gb 3, H 8012, S 9743, S 9750 e KS 9B. - *Ivan Cruz, José D. Vendramim.*

HERANÇA DA RESISTÊNCIA DE SORGO AO PULGÃO-VERDE

Selecionaram-se dois genótipos resistentes, cruzando-os com genótipos suscetíveis para se obterem as gerações F_1 que foram plantadas no campo para obtenção do F_2 . Paralelamente, fizeram-se retrocruzamentos (RC) com os pais, P_1 (resistente) e P_2 (suscetível), de modo a se ter, para as avaliações, as gerações $P_1, P_2, F_1, F_2, RC_1 (F_1 \times P_1)$ e $RC_2 (F_1 \times P_2)$.

Uma vez obtidos esses materiais, eles foram todos semeados em bandejas de chapa galvanizada com dimensões de 80x36x10 cm. Cada fileira correspondeu a uma geração, com exceção da geração F_2 , para qual o número de fileiras por bandeja foi de 5. Cada fileira continha 20 plantas. O espaçamento entre fileiras foi de 5 cm. As avaliações foram realizadas quando o genótipo suscetível apresentava uma nota de dano acima de 7 numa escala de 0 (nenhum dano) a 9 (plantas mortas). Nas gerações segregantes foram consideradas como plantas resistentes aquelas com notas de dano variando de 0 a 4. Para testar as gerações segregantes foi utilizado o teste de qui-quadrado. O número provável de gens foi também calculado pela fórmula apresentada por Burton (1951).

Como genótipos resistentes foram selecionados o BR e GB. O genótipo GR foi cruzado com o genótipo suscetível Me 022, enquanto que o GB foi cruzado com M 1011 e Me 722. A nota média de dano atribuída à geração parental foi de 1,07 para o pai resistente GR e 7,42 para o pai suscetível Me 022. Na geração F_1 a nota média foi de 1,53, bem próxima da nota obtida para o genótipo resistente, sugerindo ser um caso de dominância. Os dados da geração F_2 ajustaram-se à proporção de 3 plantas resistentes para uma planta suscetível, sugerindo que um único gen dominante controla a resistência do genótipo GR em relação ao pulgão-verde. No retrocruzamento com o pai suscetível, um número de plantas resistentes acima do esperado foi obtido. Já no cruzamento com o pai resistente, todas as plantas foram resistentes, ajustando perfeitamente ao esperado no caso de herança monogênica.

Os dados obtidos com o genótipo resistente GB foram, de maneira geral, semelhantes ao obtido com o GR. O número de pares de gens envolvido na resistência, calculado pela fórmula de Burton (1951), em ambos os casos foi 1. De modo geral, os resultados obtidos concordam com os mencionados na literatura, em que a resistência ao pulgão-verde é dominante e monogênica. - *Ivan Cruz, José D. Vendramim.*