

OCORRÊNCIA DO ÁCARO Tenuipalpus hevea EM SERINGAIS DO
ESTADO DO AMAZONAS¹

Pedro Celestino Filho²

O Tenuipalpus hevea, conhecido vulgarmente de ácaro plano da seringueira, é registrado pela primeira vez atacando plantas de seringueira no Estado do Amazonas-Brasil. As observações foram realizadas nos municípios de Manaus, Itacoatiara e Urucará, em áreas implantadas com os clones IAN 717, IAN 873 e Fx 3899 em maio e outubro de 1983. Todos os clones apresentaram-se indistintamente atacados pela praga. Observou-se a presença de ácaro na parte abaxial dos folíolos, principalmente ao longo das nervuras, onde a praga se alimenta sugando a seiva da planta. O T. hevea apresenta tamanho reduzido e coloração avermelhada. Os folíolos atacados adquirem uma coloração bronzeada, bem mais intensa na face onde se localizam os ácaros.

¹ Trabalho realizado com a participação de recursos financeiros do Convênio SUDHEVEA/EMBRAPA.

² Eng^o Agr^o, M.Sc., em Entomologia, Pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa de Seringueira e Dendê, Caixa Postal 319 - 69.000 Manaus - AM.