


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Norte


Boletim Número: 171 de 2010

Boletim Agrometeorológico da Região Norte
Período: 27/09/2010 a 04/10/2010

MONITORAMENTO: Nos últimos sete dias, os acumulados de precipitação não atingiram toda a região norte. Os acumulados mais significativos registraram entre 30 e 50 milímetros, abrangendo todo o estado de Roraima, o sudeste do Amazonas e o noroeste do Pará. Nas demais áreas do norte, os acumulados de precipitação devem oscilar entre 5 e 25 milímetros de acúmulo. No Tocantins, no centro-oeste do Acre, não houve registros de acumulados de precipitação. A umidade do solo variou entre 35 e 55 milímetros no noroeste, sudeste e nordeste do Amazonas. Já em todo o estado do Amapá e no nordeste e noroeste, a umidade do solo oscilou entre 25 e 35 milímetros. No restante do Amazonas e do Pará; em todo o estado do Acre e de Rondônia, os acumulados de precipitação registraram entre 5 e 25 milímetros. Somente no Tocantins que os acumulados não ultrapassaram os 5 milímetros ou não houve registro de reservas hídricas no solo. A estiagem agrícola variou entre 20 e 40 dias em grande parte dos estados da região norte. No sudoeste do Amazonas, no Acre e na área central do estado do Pará, a estiagem durou entre 50 e 70 dias. Ao mesmo tempo em que no Tocantins e no extremo-sul do Pará, a estiagem agrícola se prolongou ainda mais, chegando a variar entre 120 e 140 dias.



PREVISÃO: Na próxima semana, a previsão indica que os acumulados de precipitação mais significativos devem registrar entre 45 e 75 milímetros, atingindo o sudeste do Pará e todo o estado de Rondônia. Nas demais localidades, os acumulados podem variar entre 5 e 25 milímetros. No noroeste do Amazonas, no leste do Acre e em Roraima, os acumulados podem registrar entre 30 e 50 milímetros. Nas demais localidades, os acumulados devem ficar entre 5 e 25 milímetros ou pode não haver registros de acumulados de precipitação. As temperaturas máximas devem oscilar entre 33°C e 35°C em quase toda a região norte. No noroeste, centro-oeste e nordeste do Pará, assim como em todo o estado do Tocantins que as máximas devem ser ainda maiores, registrando entre 35°C e 37°C. As temperaturas mínimas podem registrar 23°C e 25°C em quase toda a região. Apenas no nordeste e noroeste (na divisa com o Amapá) do Pará que as mínimas devem oscilar entre 25°C e 27°C. Nas próximas 48 horas, todos os estados apresentam condições razoáveis de colheita e de aplicações de defensivos agrícolas. Em relação aplicação de irrigação agrícola, as condições são apropriadas para quase toda a região. Com exceção para todo o estado de Roraima e para o norte de Rondônia, onde as condições serão desfavoráveis. Grande parte dos estados da região norte não apresenta necessidade de tratamento fitossanitário, exceção feita ao Tocantins, ao Acre, ao Amapá, ao nordeste e noroeste do Pará e ao sudoeste do Amazonas. Em se tratando do manejo do solo, seguem em condições razoáveis a desfavoráveis na maioria da região. Apenas em Roraima e Rondônia que as condições oscilarão entre favoráveis a razoáveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ARROZ SEQUEIRO
COCO IRRIGADO
MAMONA
MILHO AGRI



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura