



**EMBRAPA**  
UEPAE DE MANAUS  
Estrada do Aleixo, 2.280  
Caixa Postal, 455  
69.000 - Manaus, Am.  
Fones: 236-3426 - 236-2044

# COMUNICADO TÉCNICO

Nº 13

OUTUBRO/80

01/03

## "IPEAN V - 69"

CULTIVAR DE FEIJÃO CAUPI RECOMENDADA PARA O  
ESTADO DO AMAZONAS.

Oscar Lameira Nogueira<sup>1</sup>  
Carlos da Silva Martins<sup>1</sup>

No Estado do Amazonas, o feijão caupi (*Vigna unguiculata* (L.) Walp), é cultivado em quase todos os municípios, por agricultores, que na maioria o utilizam visando o auto-abastecimento familiar, comercializando o pequeno excedente. Dentre as cultivares plantadas destacam-se: Coquinho, Chico Felipe, Manteguinha, Feijão Branco, Boca Preta, Felipinho, Figado de Galinha, Corujunha, Quarenta Dias, além de outras de menos importância, ficando a escolha das mesmas condicionada à disponibilidade de sementes por ocasião do plantio.

Tem-se observado que estas cultivares, muitas vezes, não são adequadas para os locais onde são plantadas, pois, além da baixa produtividade apresentada, são portadoras de algumas características agrônômicas inadequadas, bem como suscetibilidade às principais pragas e doenças. O ciclo muito longo (80 a 85 dias) constitui-se na característica mais imprópria para esta cultura quando explorada em área de várzea, local onde predomina o cultivo desta leguminosa no Estado.

Visando encontrar soluções para os problemas expostos, a Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual (UEPAE) de Manaus, no período de 1975 a 1979 introduziu e avaliou, em dois ecossistemas (área de várzea e terra firme), uma grande quantidade de cultivares de feijão caupi procedentes de outras regiões do país e do exterior. Aquelas de grande potencial produtivo, características agrônômicas desejáveis e de boa aceitação comercial seriam recomendadas em substituição as locais.

<sup>1</sup> Pesquisador da EMBRAPA - UEPAE de Manaus.

